


COMPORTAMIENTO EPIDEMIOLOGICO DE ENFERMEDADES SUJETAS A VIGILANCIA :

ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA

Las EDAS en nuestra Región son principalmente infecciosas constituyendo un serio problema de Salud Pública porque en una de las primeras causas de morbi-mortalidad en todas los estratos, grupos de edad vulnerables y localidades geográficas; cuyas causas estarían sustentadas en problemas de saneamiento ambiental, disposición de agua y basuras, venta ambulatoria y deficiente manipulación de alimentos. La tasa de incidencia en los últimos 3 años ha disminuido de 246.9 a 203.26 X 100,000 Hbts producto de las actividades que han desarrollado los diferentes programas que tiene el Ministerio de Salud; es así que en el mismo periodo de tiempo las provincias del estrato I tienen menor tasa de incidencia que las provincias de los estratos III y IV en donde se manifiesta evidentemente los factores de riesgo arriba mencionados agregando a ello la población más concentrada, la migración estacional por situaciones laborales y de distracción.

Figura 2.53 Canal Endémico en Menores de 5 años 1997-200, Región Arequipa 2002



Fuente: EPI-VEA

Tabla 2.88 Enfermedades Diarreicas Aguda, Arequipa 1999-2001

ESTRATOS	PROVINCIA	CASOS DE EDA EN MENORES DE 5 AÑOS					
		1999		2000		2001	
		Nº	TASA	Nº	TASA	Nº	TASA
I	DPTO AQP	28158	246.9	24449	208.17	24613	21.63
	La Unión	624	230.3	533	197.26	512	189.98
	Condesuyos	572	185.5	364	116.55	694	219.41
	Caylloma	2362	281	1749	196.34	1964	207.09
II	Castilla	1421	257.1	116	20.73	1122	197.74
	Caravelí	839	207.7	756	181.95	824	192.43
III	Camaná	1465	261.9	1206	208.61	1246	208.43
	Islay	2003	347.2	1866	319.36	1931	326.18
IV	Arequipa	18872	239.2	17859	219.57	16320	194.53

Fuente: OEPD/DIRSA